ENDOXAN® cyclophosphamide

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit par votre **médecin hospitalier ou de ville.**

Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Boîte de 50 comprimés blancs dosés à 50 mg (6.26€).

Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C.**

Gardez-le hors de portée et de la vue des enfants.

MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin. L'administration est très variable : périodes courtes de prise suivies de période sans prise ou traitement prolongé à des doses plus faibles.
Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Les comprimés d'ENDOXAN® sont à avaler entiers généralement **en une fois par jour le matin à jeun avec un grand verre d'eau.**

Vous pouvez vous aider d'un calendrier pour repérer les prises, voici un exemple :
Du 1er au 14e jour : prise des comprimés
Puis du 15e au 27e jour (soit 2 semaines d'arrêt) ou du 15e au 41e jour (soit 4 semaines d'arrêt): pas de prise d'ENDOXAN®.
Puis recommencez comme au 1er jour.

Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés ou croqués.

Pendant le traitement, il est important de boire davantage pour maintenir le bon fonctionnement des reins (si possible 1.5 litre par jour). Une eau alcaline type Vichy St Yorre est recommandée.

INTERACTIONS

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.
N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.
En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Nausées et vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Inflammation de la bouche	Les aliments acides, épicés et irritants ne sont pas conseillés. Utilisez plutôt une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.
Saignements inhabituels	En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. L'utilisation des thermomètres rectaux est à éviter. Certains médicaments sont déconseillés (aspirine, ibuprofène…).	Prévenez votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines.
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.
Présence de sang dans les urines, difficultés à uriner	Buvez, si possible, beaucoup d'eau de type Vichy Saint Yorre (alcaline).	En cas de douleurs intenses, de difficultés à uriner ou de sang dans les urines, contactez immédiatement le médecin.

Une **perte de cheveux** peut survenir, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.
Des modifications de la pigmentation des mains, des ongles et de la plante des pieds ont été signalées.

Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur ou à votre généraliste.
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :

- signes infectieux (fièvre, toux, frissons …).
- difficultés à respirer ou de modification du rythme respiratoire.
- impossibilité d'uriner, douleur intense à la vessie ou présence de sang dans les urines.
- éruption cutanée, apparition de bulles sur la peau.

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié une prise d'ENDOXAN®, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi. Pensez à bien respecter les **2 ou 4 semaines sans prise** d'ENDOXAN®.

REMARQUES :

Remerciements : - au Groupe VOCC B PL : OMIT BPL, réseaux OncoBretagne et ONCO Pays de la Loire, cliniciens, pharmaciens et infirmières d'établissements volontaires B PL, l'Ordre des Pharmaciens B PL, les Directions Régionales du Service Médical B PL, les Comités Régionaux du Médicament et des Dispositifs Médicaux B PL et le Cancéropôle Grand Ouest.
- au CH Cholet, au CHU Hôtel Dieu Nantes, au Centre Catherine de Sienne Nantes et au Comité des patients du CHRU de Brest
- à l'OMéDIT de Haute-Normandie et au Réseau Onco-Normand